

# Boletín Epidemiológico

**Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria,  
Dirección de Epidemiología, Prevención y  
Control de Emergencias y Desastres.  
Dirección Regional de  
Ayacucho, Perú**



PERÚ

Ministerio  
de SaludDirección Regional  
de Salud Ayacucho

Del 20 al 26 de marzo  
2022

## EDITORIAL

### Estado Mundial de la Infancia 2021

*En mi mente: promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia*

La pandemia por COVID-19 ha generado una gran preocupación por la salud mental de una generación de niños y niñas. Sin embargo, puede que la pandemia represente solo la punta del iceberg de la salud mental, un iceberg que hemos pasado por alto durante demasiado tiempo. El **Estado Mundial de la Infancia 2021** examina la salud mental de los niños, los adolescentes y los cuidadores. Se centra en los factores de riesgo y protección en momentos decisivos de la vida y analiza los determinantes sociales que configuran la salud mental y el bienestar. Asimismo, en el informe se hace un llamado al compromiso, la comunicación y la acción como elementos fundamentales de un enfoque integral para promover la buena salud mental de cada niño, proteger a los niños vulnerables y cuidar a los que se enfrentan a los mayores obstáculos, considerando los siguientes datos:

- Se calcula que más del 13% de los adolescentes de 10 a 19 años padecen un trastorno mental diagnosticado según la definición de la Organización Mundial de la Salud.
- La ansiedad y la depresión representan alrededor del 40% de estos trastornos de salud mental diagnosticados; los demás incluyen el trastorno por déficit de atención/hiperactividad, el trastorno de la conducta, la discapacidad intelectual, el trastorno bipolar, los trastornos alimentarios, el autismo, la esquizofrenia y un grupo de trastornos de la personalidad.
- Los niños y los jóvenes también manifiestan un malestar psicosocial que no alcanza el nivel de trastorno epidemiológico, pero que perturba su vida, su salud y sus perspectivas de futuro.
- Según una investigación llevada a cabo por Gallup para el próximo informe Changing Childhood de UNICEF, un promedio del 19% de los jóvenes de 15 a 24 años de 21 países declararon en el primer semestre de 2021 que a menudo se sienten deprimidos o tienen poco interés en realizar alguna actividad.

## CONTENIDO

### Artículo de actualidad:

**Estado Mundial de la Infancia 2021.**

**Pag. 1-2**

### Análisis de situación de salud:

Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA), neumonías y SOB (asma) en la región Ayacucho, hasta la SE 12 - 2022. Pág. 3-6.

Situación epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas y las disintéricas en la región Ayacucho, hasta la SE 12 - 2022. Pág. 6-7.

Situación de la vigilancia de Febriles en la región Ayacucho, 2022 (hasta la SE 12). Pág. 8-9.

### Indicadores de monitoreo de la notificación semanal:

Indicadores de monitoreo de la notificación de casos, en la semana epidemiológica 12 - 2022. Pág. 10-11.

Cada vez se reconoce más el vínculo que existe entre la salud mental y física y el bienestar, así como la importancia de la salud mental a la hora de definir los resultados que se esperan conseguir en la vida. Además, ese vínculo está plasmado en la relación entre la salud mental y los factores que conforman la base de un mundo sano y próspero reconocida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, en este acuerdo suscrito por las naciones del mundo se determinó que la promoción y la protección de la salud mental y el bienestar constituirían factores imprescindibles de la agenda mundial del desarrollo.


salud mental de las niñas, niños y adolescentes, especialmente en la familia y la escuela.

Fuente: UNICEF 2021

Lic. Enf. Ronald GUTIERREZ ESCOBAR  
 Resp. de Vigilancia Epidemiológica  
**DIRESA - AYACUCHO**



Costo de los trastornos de salud mental a partir del PIB per cápita por país, ajustado en términos de PPA en millones de dólares



Fuente: David McDaid y Sara Evans-Lacko, 'The Case for Investing in the Mental Health and Well-being of Children', documento informativo para el Estado Mundial de la Infancia 2021, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mayo de 2021.

**Recomendaciones:**

**COMPROMETERSE:** lograr que todas las partes involucradas, el gobierno, la sociedad civil, la académica, el sector empresarial, se centren en objetivos claros y se garantice la inversión en soluciones con evidencia científica.

**COMUNICAR:** abordar los estigmas y mejorar los conocimientos sobre salud mental. Garantizar que las niñas, niños, adolescentes formen parte de la conversación, que puedan expresar su opinión y participar en la elaboración de las respuestas centradas en la salud mental.

**ACTUAR:** trabajar para minimizar los factores de riesgo y maximizar los factores de protección de la

## Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA), neumonías y SOB (asma), Ayacucho en la Región Ayacucho, hasta la SE 12 - 2022.

### Antecedente


La Dirección General de Epidemiología (DGE) del Ministerio de Salud, realiza la vigilancia epidemiológica de la tendencia y el comportamiento de las IRA desde 1999, a través de la Directiva N° 001-DGSP/SUBPCIRA-02/99, que fue actualizada con la Directiva Sanitaria N° 046 - MINSA/DGE-V.01 con R.M. N° 506-2012/MINSA del 18 de junio de 2012, que norma la notificación de las IRA, neumonías y defunciones por neumonía, con prioridad en los grupos de riesgo: menores de 5 años y de 60 años a más a nivel nacional, en forma colectiva, de más de 7 mil establecimientos de salud (públicos y privados) seleccionados como unidades notificantes de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE).

### Situación actual

En la región Ayacucho, hasta la SE 12 del presente año, se han notificado 7740 episodios de IRA en menores de 5 años, lo que representa una incidencia acumulada (IA) de 1130.09 episodios de IRA x 10, 000 menores de 5 años. (Fig. 1).

En el presente año, los episodios de IRA y la incidencia acumulada muestran un comportamiento creciente de 664.16 % en relación a la Incidencia Acumulada reportada para el mismo período del año 2021.


**Figura 1: Episodios e incidencias acumuladas de IRA en menores de 5 años, Ayacucho 2017\* - 2022\* (\*SE 12).**



El mayor porcentaje de estas atenciones 99.68 % fueron por IRAs no complicadas (atenciones por infecciones respiratorias agudas de vías respiratorias altas, que incluyen resfrío común, faringitis aguda, bronquitis aguda y otitis media) y 0.32 % por neumonías no complicadas y neumonías complicadas.


La tendencia de las IRA no complicadas en el año 2017 muestra un patrón dentro de lo esperado según el canal endémico, ubicándose en la zona de éxito. (Fig. 2).

**Figura 2. Canal endémico de IRA en menores de 5 años, Ayacucho SE 12 - 2022.**




A la SE 12 del 2022 la IA de IRA x 10, 000 menores de 5 años es mayor en la región quechua que representa el 91.39 % mientras que en las regiones ruparupa, suni y yunga se observa un comportamiento decreciente con un 8.61 %. (Fig. 3)

**Figura 3. Incidencia de IRA en menores de 5 años por regiones naturales. Ayacucho, 2020\* - 2022\* (\*SE 12).**



Al analizar los episodios de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) según grupos de edad, tenemos que el grupo de edad que aporta mayor número de episodios es el grupo de 1 a 4 años con 5388 episodios, que representa el 69.6 % del total de episodios de IRAs notificados en menores de 5 años. Mientras que el grupo de 2 a 11 meses representa el 26.5 % con 2049 episodios; finalmente el grupo menores de 2 meses solo aporte el 3.9 % (303) (Fig. 4).


**Figura 4: Episodios de IRA según grupos de edad, Ayacucho 2017\* - 2022\* (\*SE 12).**



El 41.89% (3242) del total de episodios de las infecciones respiratorias agudas (IRA) se concentran en la provincia de HUAMANGA (TIA de 109.4 x 1 000 menores de 5 años).

Las provincias que presentan la más alta tasa de incidencia acumulada son: PAUCAR DEL SARA SARA TIA de 120.2 x 1 000 menores de 5 años (132 casos); seguido por la provincia de PARINACOCCHAS TIA de 116.2 x 1 000 menores de 5 años (414 casos); provincia de HUAMANGA TIA de 109.4 x 1 000 menores de 5 años (3242 casos). Mientras que la provincia de HUANCA SANCOS presenta la tasa más baja con 63.2 x 1 000 menores de 5 años (74 casos). (Fig. 5).

**Figura 5: Episodios de IRA según provincias. Ayacucho 2022 (\*SE 12).**




Al analizar al interior de la región por distritos, tenemos 30 de los 119 distritos que se encuentran en riesgo por presentar una tasa entre 335.84 y 7600 por 1,000 menores de 5 años en lo que va del año de la semana 01 hasta la semana 12. (Mapa 1).

En lo que va del año, los siguientes distritos presentaron mayor incidencia acumulada de IRA: CHACA IA de 7600 (114 episodios), ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY IA de 1322.7 (582 episodios), SANTA LUCIA IA de 1161.8 (79 episodios), LEONCIO PRADO IA de 946.9 (107 episodios), CANAYRE IA de 685.5 (255 episodios), PACAYCASA IA de 601.2 (205 episodios), LLOCHEGUA IA de 576.3 (789 episodios).

## Neumonías en menores de 5 años


Hasta la SE 12 se notificaron 25 episodios de neumonías no complicadas en menores de 5 años, que representa una IA de 3.65 episodios de neumonía x 10, 000 menores de 5 años. La TIA en relación al año anterior para el mismo periodo tiene un comportamiento creciente con un 1.95 %. El 58.7 % (27/46) de los casos de neumonías no complicadas y las neumonías complicadas fueron hospitalizados. (Fig. 6).

**Figura 6: Episodios e incidencias acumuladas de neumonías en menores de 5 años, Ayacucho 2017\* - 2022\* (\*SE 12).**




La curva epidémica de las neumonías en menores de 5 años presenta una tendencia ascendente y se mantiene en la zona de alarma (Fig. 5).

**Figura 7. Canal endémico de neumonías en menores de 5 años, Ayacucho. SE 12 - 2022.**




A la SE 12 - 2022, para la región Ayacucho se han notificado 0 defunciones por neumonía en menores de 5 años siendo el 0 % (0/0) intrahospitalarias. Al hacer el análisis de la tendencia de la TL (tasa de letalidad) por neumonía en menores de 5 años, se observa que en relación a los últimos 3 años para el mismo periodo se nota un comportamiento decreciente con 4.38 %. (Fig. 8).

**Figura 8. Defunciones y tasa de letalidad (%) por neumonías en menores de 5 años, Ayacucho 2011 - 2022\* (\*SE 12).**



La TL por neumonía en menores de 5 años a nivel de la región Ayacucho hasta la SE 12 - 2022 es de 0 % (Fig. 9).

**Figura 9. Neumonías, defunciones y tasa de letalidad (%) por neumonías en menores de 5 años, Ayacucho 2022\* (\*SE 12).**




### Neumonías en mayores de 5 años

Para los mayores de 5 años, grupo también considerado de riesgo para neumonía, a la SE 12 - 2022, se han notificado 1054 episodios de neumonía con una IA a nivel regional de 1.68 x 10, 000 mayores de 5 años, con un comportamiento decreciente de 6.54 %; si comparamos el año anterior para el mismo período que fue de 8.22 x 1 000 mayores de 5 años.

Hasta la SE 12 - 2022 Se han notificado 78 defunciones en este grupo de riesgo y una TL regional de 7.4 % que tiene un comportamiento decreciente en 4.97 % en relación al año 2021 que fue de 12.37 %. El 100 % (78/78) de las defunciones por neumonías fueron intrahospitalarias. (Fig. 10).


**Figura 10. Neumonías, defunciones y tasa de letalidad (%) por neumonías en mayores de 5 años, Ayacucho 2022\* (\*SE 12).**



### Síndrome obstructivo bronquial (SOBA) en menores de 5 años

Hasta la SE 12 - 2022 se han notificado 102 episodios de síndrome obstructivo bronquial (SOB)/asma en menores de 5 años, con una IA (incidencia acumulada) de 14.89 % episodios de (SOB)/asma x 10, 000 en menores de 5 años, que presenta una tendencia creciente en relación al año 2021. (Fig. 11).

**Figura 11: Episodios e incidencias acumuladas de SOBA/Asma en menores de 5 años, Ayacucho 2017\* - 2022\* (\*SE 12).**



### Conclusiones:

- Se observa una tendencia creciente en la IA de IRA en menores de 5 años de 664.16 % comparada con el mismo período del año anterior y la tendencia de su curva epidémica es descendente.
- La IA de neumonías es de 3.65 x 10, 000 menores de 5 años, con una tendencia creciente comparada en el mismo período del año anterior.
- En el grupo de menores de 5 años, se han notificado 0 defunciones por neumonía en menores de 5 años con una tasa de letalidad de 0 en relación al año anterior con una tendencia decreciente en 4.38 %.
- En el grupo de mayores de 5 años, la IA en neumonías para el año 2022 es de 1.68 x 10, 000, menor que en el 2021. La TL en el año 2022 es de 7.4 % menor que en el 2021.

## Recomendaciones

- Fortalecer las acciones de prevención de IRA y neumonías con énfasis en los grupos de mayor riesgo: menores de 5 años y adultos de 60 años a más.
- Promover en la población el reconocimiento precoz de las señales de alarma en neumonía, para un diagnóstico y tratamiento oportuno disminuyendo el riesgo de muerte.
- Fomentar campañas de vacunación contra influenza y neumococo con énfasis en los grupos de mayor riesgo asimismo hábitos saludables a fin de evitar la diseminación de infecciones respiratorias.
- Fomentar el uso del protocolo de atención en enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) en los establecimientos de salud del primer nivel.

## Situación epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y las disintéricas Región Ayacucho. Región Ayacucho, hasta la SE 12 - 2022.

### Antecedentes

Las EDA continúan siendo un problema de salud mundial, especialmente en los países en desarrollo, donde representan una importante causa de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años. A pesar de la reducción de la mortalidad que se ha producido en los últimos años, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, son la segunda causa de mortalidad en el mundo, cada año matan más de 760 000 niños menores de 5 años y que ocurren más de mil millones de episodios [1].


La causa principal de muerte es la deshidratación lo cual resulta por pérdida de líquidos y electrolitos. La diarrea es una causa importante de desnutrición, esto se debe a que durante la enfermedad los pacientes comen menos por la anorexia y se reduce transitoriamente la capacidad de absorción intestinal [2].

En promedio los niños padecen 3.3 episodios de diarrea por año, pero en algunas regiones, el promedio pasa de 9 episodios anuales; es común, donde estas enfermedades son frecuentes, que los niños pasen el 15% de sus vidas con diarreas [3]. Los episodios múltiples de diarrea en el primer año de vida pueden deteriorar el estado nutricional y causar graves secuelas.

### Situación actual


En la región Ayacucho, hasta la SE 12 del presente año, se han notificado 1458 episodios de EDA en menores de 5 años, con una incidencia acumulada (IA) de 21.29 episodios de EDA x 1 000 menores de 5 años, observándose un comportamiento creciente de 5.07 % en relación a la Incidencia Acumulada reportada para el mismo período del año 2021 (Fig. 12).

**Figura 12: Episodios e incidencias acumuladas de EDA en menores de 5 años, Región Ayacucho. 2017\* - 2022\* (\*SE 12).**




Generalmente se evidencia mayor porcentaje de EDA en los meses de verano, sin embargo los episodios notificados estuvieron dentro de lo esperado en la zona de éxito según el canal endémico (Fig. 11).


**Figura 13. Canal endémico de EDA en menores de 5 años, Región Ayacucho. SE 12 - 2022.**



Las provincias que presentan la más alta tasa de incidencia acumulada de Edas Acuósas en menores de 5 años son: PARINACOCHAS TIA de 53.9 x 1 000 menores de 5 años (191 episodios); seguido por la provincia de PAUCAR DEL SARA SARA TIA de 39.7 x 1 000 menores de 5 años (43 episodios); provincia de LUCANAS TIA de 26.9 x 1 000 menores de 5 años (180 episodios). Mientras que la provincia de VICTOR FAJARDO presenta la tasa más baja con 4.7 x 1 000 menores de 5 años (11 episodios). (Fig. 14).

**Figura 14: Episodios de EDA Acuosa según provincias. Ayacucho. 2022\* (\*SE 12).**

Hasta la SE 12 del presente año en la región Ayacucho, se han notificado 1257 episodios de enfermedades diarreicas agudas en mayores de 5 años, con una incidencia acumulada (IA) de 2.04 episodios de EDA x 1 000 mayores de 5 años, observándose un comportamiento creciente de 0.07 % en relación a la Incidencia Acumulada reportada para el mismo período del año 2021 (Fig. 15).


**Figura 15: Episodios e incidencias acumuladas de EDA en mayores de 5 años, Región Ayacucho. 2017\* - 2022\* (\*SE 12).**

## Enfermedades diarreicas disintéricas

En la región Ayacucho, hasta la SE 12 del presente año, se han notificado 42 episodios de enfermedades diarreicas disintéricas en menores de 5 años, con una incidencia acumulada (IA) de 0.61 episodios de disenterias x 1 000 menores de 5 años; observándose un comportamiento decreciente de 0.1 % en relación a la Incidencia Acumulada reportada para el mismo período del año 2021 (Fig. 16).

**Figura 16: Episodios e incidencias acumuladas de EDA disintéricas en menores de 5 años Región Ayacucho. 2017\* - 2022\* (\*SE 12).**

Hasta la SE 12 del presente año en la región Ayacucho, se han notificado 40 episodios de enfermedades diarreicas disintéricas en mayores de 5 años, con una incidencia acumulada (IA) de 0.07 episodios de EDA x 1 000 mayores de 5 años, observándose un comportamiento creciente de 0.01 % en relación a la Incidencia Acumulada reportada para el mismo período del año 2021 (Fig. 17).

**Figura 17: Episodios e incidencias acumuladas de EDA disintéricas en mayores de 5 años Región Ayacucho. 2017\* - 2022\* (\*SE 12).**

## Referencias bibliográficas:

1. Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades diarreicas. Nota descriptiva N° 330. Abril 2013. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/>
2. Hevia Bernal, Daisy. Enfermedad Diarreica Aguda: Un problema siempre emergente. Boletín de Medicina General Integral. 2002.
3. Organización Panamericana de la Salud. Enfermedades Diarreicas. Prevención y tratamiento. Epidemiología y etiología de las diarreas. OPS; 1995.

## Vigilancia Epidemiológica de Febriles, Ayacucho. 2022\* (Hasta la S.E. 12)

### Antecedentes


La Dirección General de Epidemiología (DGE) del Ministerio de Salud, realiza la vigilancia epidemiológica de Febriles desde el año 2005, a través de la Directiva N° 064-MINSA/OGE-V.01, que fue actualizada con la Directiva Sanitaria N° 057 - MINSA/DGE - INS. V.01 con R.M. N° 734-2014/MINSA del 26 de setiembre del 2014, que norma la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio de la Fiebre de Chikungunya en el Perú.

El personal de salud debe realizar la vigilancia de febriles (temperatura axilar igual o mayor a 38 °C) con o sin foco de infección desde menores de 1 año hasta mayores de 65 años de edad que acude a un establecimiento de salud en búsqueda de atención, con la finalidad de detectar incrementos inusuales de casos y para que el personal de epidemiología analice las tendencias, de acuerdo a las siguientes consideraciones.

### Situación actual


En la región Ayacucho, hasta la SE 12 del presente año, se han notificado 1348 casos de febriles totales, con una razón de 4 febriles x cada 100 atenciones, observándose un comportamiento decreciente de 0.7 % en relación a los febriles notificados para el mismo período del año 2021 (Fig. 20).

**Figura 20: Casos de Febriles Totales y Razón, Región Ayacucho. 2016\* - 2022\* (\*SE 12).**




El comportamiento semanal de los casos de febriles totales notificados, hasta la SE 12 del presente año, se puede evidenciar que en relación a la semana anterior tenemos 22 casos Más notificados, que muestra un comportamiento decreciente en un 1.6 %. (Fig. 21).

**Figura 21: Tendencia por semanas de Febriles Totales según años, región Ayacucho 2020\* - 2022\* (\*SE 12).**




El mayor porcentaje de los febriles notificados hasta la SE 12 aporta el grupo de edad 20\_59 años, con un 29.5 % (397) del total de Febriles notificados; seguido del grupo de edad 1\_4 años con un 26.3 % (355); seguido por el grupo de 5\_9 años con 16.7 % (225) del total de febriles notificados. (Fig. 22)

**Figura 22: Casos de Febriles Totales según grupos de edad, región Ayacucho 2022\* (\*SE 12).**



El 17.4 % (235) del total de febriles notificados por la región Ayacucho, hasta la SE 12 del 2022 se concentran en el distrito de JESUS NAZARENO (Razón de 5.4 x cada 100 atenciones); el 13.5 % (182) en el distrito de HUANTA (Razón de 2.9 x cada 100 atenciones); el 12.5 % (168) en el distrito de AYACUCHO (Razón de 2.2 x cada 100 atenciones). (Fig. 23 y Tabla 2)



**Figura 23: Casos de Febriles Totales según distritos, región Ayacucho 2021\* - 2022\* (\*SE 12).****Tabla 02: Casos de Febriles Totales y Razón según distritos, región Ayacucho 2021\* - 2022\* (\*SE 12).**

Distritos	2021*			2022*		
	Casos	N° Atenc.	Razón	Casos	N° Atenc.	Razón
ANCO	119	973	12.2	53	863	6.1
AYACUCHO	49	6649	0.7	168	7737	2.2
AYNA	124	2819	4.4	126	3464	3.6
CHUNGUI	0	0	0	0	0	0
HUANTA	202	3697	5.5	182	6356	2.9
IGUAIN	0	0	0	0	0	0
LLOCHEGUA	194	2362	8.2	164	2216	7.4
SANTA ROSA	146	3174	4.6	100	3478	2.9
SANTILLANA	0	0	0	0	0	0
SIVIA	86	858	10	136	2218	6.1
SAMUGARI	90	1545	5.8	30	698	4.3
JESUS NAZARENO	123	2946	4.2	235	4368	5.4
CANAYRE	55	791	7	65	1656	3.9
ANCHIHUAY	41	435	9.4	89	702	12.7
SANTA LUCIA	0	0	0	0	0	0
<b>Total DIRESA</b>	<b>1229</b>	<b>26249</b>	<b>4.7</b>	<b>1348</b>	<b>33756</b>	<b>4</b>

FUENTE: NOTISP - Febriles / Epidemiología - ASIS

**Tabla 03: Casos de Febriles Totales y Razón según Establecimientos de Salud, región Ayacucho 2021\* - 2022\* (\*SE 12).**

Establecimientos de Salud	2021*			2022*		
	Casos	N° Atenc.	Razón	Casos	N° Atenc.	Razón
C.S. LLOCHEGUA	150	2039	7.4	84	1389	6
C.S. PALMAPAMPA	44	1060	4.2	9	403	2.2
C.S. SAN MARTIN	113	901	12.5	45	766	5.9
C.S. SANTA ROSA	130	2998	4.3	72	2979	2.4
HOSP. APOYO SAN FRANCISCO	101	2551	4	114	3329	3.4
HOSP. APOYO SIVIA	15	298	5	49	1440	3.4
P.S. AMARGURA	0	0	0	0	0	0
P.S. ANCHIHUAY	26	269	9.7	71	603	11.8
P.S. AREQUIPA	4	13	30.8	2	9	22.2
P.S. ARHUIMAYO	0	0	0	2	19	10.5
P.S. BUENA GANA	2	71	2.8	8	42	19
P.S. CANAL	1	10	10	3	22	13.6
P.S. CANAYRE	47	714	6.6	65	1703	3.8
P.S. CHIHUILLO ALTO SAN ANTONIO	2	13	15.4	1	7	14.3
P.S. CHONGOS CARMEN PAMPA NIVEL I-1	0	0	0	0	0	0
P.S. CHUVIVANA	1	4	25	11	59	18.6
P.S. COMUMPIARI	0	0	0	1	12	8.3
P.S. CORAZONPATA	0	0	0	2	10	20
P.S. GLORIA SOL NACIENTE	4	41	9.8	17	205	8.3
P.S. GUAYAQUIL	0	0	0	3	29	10.3
P.S. LECHEMAYO	8	77	10.4	5	58	8.6
P.S. MACHENTE	5	39	12.8	8	103	7.8
P.S. MARINTARI	3	64	4.7	18	354	5.1
P.S. MATUCANA	5	25	20	1	11	9.1
P.S. MAYAPO	12	72	16.7	7	109	6.4
P.S. MONTERRICO	33	327	10.1	11	186	5.9
P.S. NUEVA JERUSALEN	0	0	0	4	60	6.7
P.S. NUEVA SANTA ROSA	9	91	9.9	11	85	12.9
P.S. PICHIHUILCA	10	138	7.2	7	87	8
P.S. PUERTO AMARGURA	19	152	12.5	31	301	10.3
P.S. ROSARIO	18	229	7.9	4	32	12.5
P.S. ROSARIO ACON	2	20	10	17	129	13.2
P.S. SAN GERARDO	24	99	24.2	8	50	16
P.S. SAN JOSE DE VILLA VISTA	0	0	0	0	0	0
P.S. SIMARIVA	13	112	11.6	5	73	6.8
P.S. TRIBOLINE	35	382	9.2	34	377	9
P.S. TUTUMBARO	4	30	13.3	13	123	10.6
P.S. VILLA MEJORADA	1	11	9.1	2	19	10.5
P.S. YARURI	1	7	14.3	7	35	20
HOSP. REGIONAL AYACUCHO	49	6649	0.7	141	7413	1.9
HOSP. APOYO HUANTA	202	3697	5.5	182	6356	2.9
HOSP. APOYO JESUS NAZARENO	123	2946	4.2	262	4692	5.6
P.S. OTOCA	0	0	0	0	0	0
P.S. CONCEPCION LARAMATE	0	0	0	0	0	0
P.S. HUANCA	0	0	0	0	0	0
C.S. LLAUTA	0	0	0	0	0	0
<b>Total DIRESA</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>77</b>	<b>14.3</b>

## Indicadores de monitoreo de la notificación de casos

### Indicadores de monitoreo de la notificación en la semana epidemiológica 12 - 2022.

Los indicadores de monitoreo contribuyen a mejorar la disposición de información oportuna y de calidad en el Sistema Regional de Vigilancia Epidemiológica, que permiten el procesamiento y análisis para la toma de decisiones en la prevención y control de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica en Salud Pública.


La ponderación de indicadores equivale al 100%.

En la SE 12 - 2022 la Red Regional de Epidemiología obtuvo un puntaje ponderado de 96.8 sobre 100 puntos calificado como Optimo.


El indicador más bajo para la SE 12 fue Oportunidad con 78.52 sobre 100 %, calificado como Debil.

Respecto a los demás indicadores, la Red Regional de Epidemiología alcanzó en Calidad del dato con (100%), Seguimiento (100%) y Regularización (100%) calificando como Optimo y Optimo respectivamente. Y los indicadores de Retroinformación y (100%) (%) respectivamente. (Fig. 1).

**Figura 1: Indicadores de monitoreo de la información del sistema de vigilancia epidemiológica por Redes de Salud, DIRESA Ayacucho SE 12 - 2022.**




**Figura 2: Puntaje desagregado de los indicadores de monitoreo de la información del sistema de vigilancia epidemiológica, Ayacucho SE 12 - 2022.**



Analizando los indicadores de monitoreo semanal a nivel de Redes, a la SE 12, podemos observar que la Red de Salud HOSP. REGIONAL obtuvo el puntaje más bajo 87.5% calificando como Bueno. El indicador más bajo en esta Red de Salud fue, Oportunidad con 50% del total calificado. (Fig. 3).

**Figura 3: Puntaje desagregado de los indicadores de monitoreo de la información del sistema de vigilancia epidemiológica. Red de Salud HOSP. REGIONAL, SE 12 - 2022.**



**Dirección Regional de Salud Ayacucho**

MG. Elyvn Samuel DIAZ TELLO  
Director Regional

**Equipo Editor**

Lic. Enf. Walter Víctor Reyes Araujo  
Director Ejecutivo de Inteligencia Sanitaria

Blgo. Carlos Juscamaita Chipana  
Director de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias  
y Desastres

Lic. Else Mayú Quispe Vallejo  
Lic. Guisela Lucy Sulca Jayo  
Lic. Ronald Gutierrez Escobar  
Blga. Vanesa García Apaico

**Resp. Análisis Situacional de Salud**

Tec. Inform. Ivan Bonilla García  
Téc. Inform. Zayda Sarmiento Casavilca  
Ing. Sistemas Ayde Quispe Gomez

**Equipo de Intervención Integral**

M.C. Artur Tenorio Aronés  
Lic. Enf. Diana Llantoy Peña  
Blga. Merilly Ore Murillo

**Unidad Técnica de Notificación**

Téc. San. Teófanos Hinostraza Tineo  
Secretaria. Beatriz Cecilia Coras Cruz

**Boletín Epidemiológico**

El Boletín Epidemiológico (Ayacucho), es la publicación oficial de la Dirección de Epidemiología Prevención y control de Emergencias y Desastres, de la Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria – Dirección Regional de Salud Ayacucho. El Boletín, se edita semanalmente; cada volumen anual tiene 52 o 53 números, y estos últimos números consolidan el análisis anual.

El Boletín epidemiológico, publica la situación o tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a notificación obligatoria, las normas acerca de la vigilancia epidemiológica en salud pública en el Perú, los informes técnicos de brotes y otras emergencias sanitarias, resúmenes de trabajos de investigación desarrollados por el personal de la Red Nacional de Epidemiología y otras informaciones de interés para el personal de salud del país y de la región.

**Visite nuestra Web:**

<http://www.saludayacucho.gob.pe/web/index.php/dvsp-epidemiologia-boletines-epidemiologicos-2012>.

La información del presente Boletín Epidemiológico, procede de la notificación de 400 establecimientos de salud de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, registrados en el sistema nacional de notificación epidemiológica, de estos 359 son Unidades Notificantes, 07 Redes de Salud, 49 Microredes, reconocidos con Resolución Directoral de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.

La RENACE está conformada por establecimientos del Ministerio de Salud, EsSalud y otros del sector en sus diferentes niveles de las 33 Direcciones de Salud que tiene el Perú.

La información contenida en la sección de tendencia del boletín es actualizada cada semana o mes. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación. Esta información es suministrada semanalmente por las Redes de Salud, cuya fuente es el registro semanal de enfermedades y eventos sujetos a notificación inmediata o semanal. La Semana Epidemiológica inicia el día domingo de cada semana y concluye el día sábado siguiente.

Los artículos de investigación son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones oficiales de la Dirección General de Epidemiología.

**Dirección Ejecutiva de Salud Pública**  
**Dirección de Epidemiología Emergencias y Desastres**  
**Dirección Regional de Salud Ayacucho**

**Ayacucho,**  
**Teléfono: (066) 490400 Anexo: 108**

